



Preparación para la cirugía ambulatoria

El Centro Clínico de los
Institutos Nacionales de Salud

Instrucciones después de una biopsia del riñón

1. A la mañana siguiente del procedimiento, usted puede quitarse el vendaje que le pusieron en el lugar de la biopsia.
2. Usted puede bañarse a la mañana siguiente de la biopsia.
3. No haga ninguna actividad o ejercicio agotador durante 5 días después de la biopsia.
4. Si siente dolor, tome Tylenol 325 mg: dos comprimidos cada 4 a 6 horas. Si el dolor no le pasa o si persiste por más de 48 horas, llame al centro de trasplantes a los teléfonos citados abajo.
5. Llame al médico si experimenta:
 - Fiebre
 - Escalofríos
 - Enrojecimiento o dolor al tocar el lugar de la biopsia
 - Secreción en el lugar de la biopsia
 - Dificultad para orinar o imposibilidad de hacerlo
 - Sangrado proveniente del lugar de la biopsia
 - Sangre en la orina
 - Orina de muy mal olor
 - Dolor abdominal
6. Otras instrucciones:

Contactos (Comuníquese con los miembros del personal que hay en la lista de abajo llamando al operador de buscapersonas de los NIH al **301-496-1211**).

Su médico:



2005

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico en los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico? OCCC@cc.nih.gov

En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos ilustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte del NIH para dichos productos; ni tampoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó implica que dicho producto no sea satisfactorio.

El Centro Clínico de los
Institutos Nacionales de Salud
Bethesda, MD 20892